



Rosa Rapa.

D. A. Poncelet pinx.

Rosier Turneps.

Imprimé de Remond.

Charles sculp.

LES ROSES.

7

ROSA RAPA

Flore sempiterna. (Voyez ci-après l'espèce n° 3, var. 4.)

LE ROSIER TURNEPS.

DESCRIPTION.

Les rameaux florifères de cet arbrisseau sont dépourvus d'aiguillons; mais les branches adultes en présentent un petit nombre. Les folioles sont ovales-oblongues, glabres, luisantes comme celles du *R. Lucida*, cependant d'un verd plus foncé. Les fleurs se développent lentement, et avortent pour la plus part. Les tubes des calices sont turbinés, et les divisions calicinales très-longues et découpées en leur bord. Corolle de quatre ou cinq rangs de pétales. Fruits globuleux.

Déposition méthodique, en un seul groupe, des espèces de Rosiers dont les fleurs présentent des calices à tubes turbinés.

ROSÆ TURBINATÆ

Hæc sex, nisi sequentibus facile distinguenda:

1° *Germinibus*, ante anthesin, turbinatis, aliquando medio, aliquando apice contractis, subglobosis, hispides; 2° *pedunculis* hispido-glandulosis, floribusque floccis in §. 1. glabris floribusque luteis in §. 2. 3° *foliis* simpliciter dentatis; 4° *petalis* sæpe non explatis, 5° et denique, styli numerosissimis.

§. 1.

Flores roseæ; pedunculi hispides.

** Rameaux florifères sans aiguillons.*

1. *R. Turbinata*. REDOUTE R. tome 1, p. et fig. 127.
2. *R. Turbinata inflata*, floribus cymosis: cyma trifida. (N.) Variété plus petite dans toutes ses parties.
3. *R. Rapa*. Bosc. Nouv. Cours, vol. 11, p. 247. — *R. (Turgida)*. PERK. Syn. 2, p. 49. R. (*Frasinifolia*). Bot. Cult. ed. 2. n° 28.
4. *R. Germinibus turbinatis*, apice contractis, pedunculisque glandulosis-hispidis; foliis lucidis, ovatis, basi apiceque acutis; laciniis calycinis corollæ longioribus. (N.) Vulg. le Rosier à feuilles de frêne; le Rosier Turneps des Anglais.